



La Bureba
Oca-Tirón
Ebro-Treviño
Río Ubierna
Las Navas

(Burgos-España)





Dentro de la línea emprendida para potenciar los recursos naturales de la zona como herramientas del desarrollo comarcal sostenible, la asociación ADECO BUREBA edita esta Guía de Campo sobre las aves que pueblan nuestro territorio.

La asociación participa en el programa TRINO (Turismo Rural de Interior y Ornitología), propuesta de veinticuatro Grupos de Acción Local del programa LEADERCAL en Castilla y León cuyo principal objetivo es promocionar el turismo ornitológico en la Comunidad de Castilla y León.

La educación ambiental entre la población infantil y juvenil, la sensibilización de los agricultores, silvicultores y ganaderos, y la formación de guías, constituyen otros objetivos de este programa, para que los territorios rurales adquieran unas mayores cotas de concienciación ambiental.

La variedad de espacios presentes en este territorio burgalés, que es zona de transición entre las regiones eurosiberiana y mediterránea, se traduce en la gran riqueza ornitológica que aquí presentamos.

EXPLICACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LAS FICHAS



Hábitat urbano



Cultivos y páramos



Bosques y arbolados



Ríos y humedales



Zonas de montaña



Nombre común (*Nombre científico*) **FAMILIA**

Breve descripción de las principales características del ave para su correcta identificación.

E F M A M J
J A S O N D



Estatus (nidificación)
Estado de la población

Foto del ave

Calendario. En oscuro, meses de presencia segura del ave en la zona.

Icono del hábitat más habitual que ocupa la especie en el territorio.

Datos según el Anuario Ornitológico de Burgos (Vol. II, 2009).

Este amplio territorio burgalés se extiende entre las últimas estribaciones de la Cordillera Cantábrica por el norte, las elevaciones del Sistema Ibérico por el sur, los páramos burgaleses al oeste y el valle del Ebro al este. En conjunto, es una zona de transición entre las montañas del norte peninsular y la meseta central, entre la región eurosiberiana y la mediterránea. El territorio se divide en cuatro áreas diferenciadas.

Ubierna y Las Navas

La histórica Merindad de Río Ubierna se divide en dos espacios bien diferenciados: el páramo, al norte, y el valle, en la zona más meridional. Entre ambos se sitúan las últimas estribaciones de la Cordillera Cantábrica. También encontramos zonas de humedal en las lagunas kársticas de Cernégula, Masa y Ubierna. Los distintos desfiladeros y torcas completan esta gran variedad.

La Bureba

Caracterizada por sus extensos campos de cereal y llanuras surcadas por ríos y arroyos con sus bosques de ribera. La intensa labor agrícola desarrollada a lo largo de los siglos marca la fisonomía actual burebana. Su relieve, poco acentuado, se sitúa entre los 650 y los 800 metros sobre el nivel del mar.

En La Bureba anidan especies emblemáticas como el cernícalo primitivo o el elanio azul.

Los valles del Oca y el Tirón

El río Oca configura el conocido como “Valle de los Ajos”, con sus característicos cerros redondeados por la erosión sobre frondosos bosques de ribera.

En la zona sureste el río Tirón alcanza una considerable anchura en algunos tramos para internarse poco después en la comunidad de La Rioja. Esta zona es conocida como la “Riojilla Burgalesa”, marcada por el paso del Camino de Santiago. La garza real, el martín pescador y otras especies acuáticas habitan las márgenes del Tirón.

El Condado de Treviño

Rodeado por tierras alavesas, en el enclave de Treviño conviven los bosques típicamente atlánticos con los de tipología mediterránea. Por tanto, encontramos hayas, fresnos, acebos, boj, quejigos y encinares. Se caracteriza por su gran variedad de accidentes geográficos. Los ríos más destacados del Condado de Treviño son el Ayuda, con su espectacular desfiladero, y el Zadorra. Esta riqueza y variedad natural hace del Condado de Treviño un escenario privilegiado para la observación de aves poco habituales en la provincia, como el pico mediano.

Parque Natural de los Montes Obarenes

ZEPA desde el año 2000, clasificado en 2006 como Parque Natural.

Extensión: 45.260 has.

Águila perdicera, búho real, halcón peregrino, águila real y calzada, buitre leonado, alimoche. Acuáticas en su límite noreste, en la ribera del Ebro.



ZEPA Montes de Miranda y Ameyugo

Extensión: 6.661,81 has. Águila real, águila perdicera, bisbita, martín pescador, buitre leonado, curruca rabilarga, alcaudón dorsirrojo, aguilucho pálido.



ZEPA

Sierra de la Tesla-Valdivielso

Extensión: 22.231 has. Chova piquirroja, aguilucho pálido, alimoche, chocha perdiz.

Destaca la población reproductora de buitre leonado (*Gyps fulvus*), que cuenta con 125 parejas, con importancia internacional.



ANATIDAE

Ánade real (*Anas platyrhynchos*)

PHASIANIDAE

Codorniz (*Coturnix coturnix*)

Perdiz roja (*Alectoris rufa*)

PODICIPEDIDAE

Zampullín chico (*Tachybaptus ruficollis*)

PHALACROCORACIDAE

Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*)

ARDEIDAE

Garza real (*Ardea cinerea*)

CICONIIDAE

Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*)

ACCIPITRIDAE

Abejero europeo (*Pernis apivorus*)

Elanio común (*Elanus caeruleus*)

Milano negro (*Milvus migrans*)

Milano real (*Milvus milvus*)

Alimoche (*Neophron pernocterus*)

Buitre leonado (*Gyps fulvus*)

Culebrera europea (*Circaetus gallicus*)

Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*)

Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*)

Azor común (*Accipiter gentilis*)

Gavilán común (*Accipiter nisus*)

Busardo ratonero (*Buteo buteo*)

Águila real (*Aquila chrysaetos*)

Aguillilla calzada (*Hieraaetus pennatus*)

Águila-azor perdicera (*Hieraaetus fasciatus*)

FALCONIDAE

Cernícalo primilla (*Falco naumanni*)

Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*)

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Alcotán (*Falco subbuteo*)

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

RALLIDAE

Rascón (*Rallus aquaticus*)

Focha común (*Fulica atra*)

Gallineta común (*Gallinula chloropus*)

BURHINIDAE

Alcaraván (*Burhinus oedicephalus*)

CHARADRIIDAE

Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)

Avefría (*Vanellus vanellus*)

SCOLOPACIDAE

Becada (*Scolopux rusticola*)

Andarrios chico (*Actitis hypoleucos*)

COLUMBIDAE

Paloma doméstica (*Columba livia*)

Paloma zurita (*Columba oenas*)

Paloma torcaz (*Columba palumbus*)

Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*)

Tórtola común (*Streptopelia turtur*)

CUCULIDAE

Crialo (*Clamator glandarius*)

Cuco (*Cuculus canorus*)

TYTONIDAE

Lechuza común (*Tyto alba*)

STRIGIDAE

Autillo (*Otus scops*)

Búho real (*Bubo bubo*)

Mochuelo (*Athene noctua*)

Cáрабо (*Strix aluco*)

Búho chico (*Asio otus*)

Lechuza campestre (*Asio flammeus*)

CAPRIMULGIDAE

Chotacabras (*Phalaenoptilus nuttallii*)

APODIDAE

Vencejo real (*Tachymartus melba*)

Vencejo común (*Apus apus*)

ALCEDINIDAE

Martín pescador (*Alcedo atthis*)

MEROPIIDAE

Abejaruco (*Merops apiaster*)

CORACIIDAE

Carraca (*Coracias garrulus*)

UPUPIDAE

Abubilla (*Upupa epops*)

PICIDAE

Torcecuello (*Jynx torquilla*)

Pito real (*Picus viridis*)

Pico picapinos (*Dendrocopos major*)

Pico mediano (*Dendrocopos medius*)

Pico menor (*Dendrocopos minor*)

ALAUDIDAE

Calandria (*Melanocorypha calandria*)

Terrera (*Calandrella brachydactyla*)

Cogujada común (*Galerida cristata*)

Cogujada montesina (*Galerida theklae*)

Totovia (*Lullula arborea*)

Alondra común (*Alauda arvensis*)

HIRUNDINIDAE

Avión zapador (*Riparia riparia*)

Avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*)

Golondrina común (*Hirundo rustica*)

Golondrina dáurica (*Hirundo daurica*)

Avión común (*Delichon urbicum*)

MOTACILLIDAE

- Bisbita campestre (*Anthus campestris*)
 Bisbita arbóreo (*Anthus trivialis*)
 Bisbita alpino (*Anthus spinoletta*)
 Lavandera boyera (*Motacilla flava*)
 Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)
 Lavandera blanca (*Motacilla alba*)

CINCLIDAE

- Mirlo acuático (*Cinclus cinclus*)

TROGLODYTIDAE

- Chochín (*Troglodytes troglodytes*)

PRUNELLIDAE

- Acentor común (*Prunella modularis*)

TURDIDAE

- Petirrojo (*Erithacus rubecula*)
 Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos*)
 Colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*)
 Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*)
 Tarabilla norteña (*Saxicola rubetra*)
 Tarabilla común (*Saxicola torquatus*)
 Collalba gris (*Oenanthe oenanthe*)
 Collalba rubia (*Oenanthe hispanica*)
 Roquero rojo (*Monticola saxatilis*)
 Roquero solitario (*Monticola solitarius*)
 Mirlo común (*Turdus merula*)
 Zorzal común (*Turdus philomelos*)
 Zorzal charlo (*Turdus viscivorus*)

SYLVIIDAE

- Ruiseñor bastardo (*Cettia cetti*)
 Buitrón (*Cisticola juncidis*)
 Carricero c. (*Acrocephalus schoenobaenus*)
 Carricero tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)
 Zarcero común (*Hippolais polyglotta*)
 Curruca rabilarga (*Sylvia undata*)
 Curruca tomillera (*Sylvia conspicillata*)
 Curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans*)
 Curruca cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)
 Curruca mirlona (*Sylvia hortensis*)
 Curruca zarcera (*Sylvia communis*)
 Curruca mosquitera (*Sylvia borin*)
 Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*)
 Mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*)
 Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)
 Reyzeuelo sencillo (*Regulus regulus*)
 Reyzeuelo listado (*Regulus ignicapilla*)

MUSCICAPIDAE

- Papamoscas gris (*Muscicapa striata*)
 Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

AEGITHALIDAE

- Mito (*Aegithalos caudatus*)

PARIDAE

- Carbonero palustre (*Parus palustris*)
 Herrerillo capuchino (*Parus cristatus*)
 Carbonero garrapinos (*Parus ater*)
 Herrerillo común (*Parus caeruleus*)
 Carbonero común (*Parus major*)

SITTIDAE

- Trepador azul (*Sitta europaea*)

CERTHIIDAE

- Agateador com. (*Certhia brachydactyla*)

REMIZIDAE

- Pájaro moscón (*Remiz pendulinus*)

ORIOOLIDAE

- Oropéndola (*Oriolus oriolus*)

LANIIDAE

- Alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*)
 Alcaudón real (*Lanius meridionalis*)
 Alcaudón común (*Lanius senator*)

CORVIDAE

- Arrendajo (*Garrulus glandarius*)
 Urraca (*Pica pica*)
 Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
 Grajilla (*Corvus monedula*)
 Corneja (*Corvus corone*)
 Cuervo (*Corvus corax*)

STURNIDAE

- Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)
 Estornino negro (*Sturnus unicolor*)

PASSERIDAE


- Gorrión común (*Passer domesticus*)
 Gorrión molinero (*Passer montanus*)
 Gorrión chillón (*Petronia petronia*)

FRINGILLIDAE

- Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*)
 Verdeccillo (*Serinus serinus*)
 Verderón común (*Carduelis chloris*)
 Jilguero (*Carduelis carduelis*)
 Pardillo común (*Carduelis cannabina*)
 Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*)
 Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

EMBERIZIDAE

- Escribano cerillo (*Emberiza citrinella*)
 Escribano soteño (*Emberiza cirulus*)
 Escribano montesino (*Emberiza cia*)
 Escribano hortelano (*Emberiza hortulana*)
 Escribano palustre (*Emberiza schoeniclus*)
 Triguero (*Emberiza calandra*)


Ánade real (*Anas platyrhynchos*) ANATIDAE

Grande y robusto. Cabeza y pico grandes, cola corta. Patas anaranjadas. Macho, cabeza verde metálica, hembra adulta listada de pardo. Gregario, habita en ríos, lagos y estanques.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
En aumento

Codorniz (*Coturnix coturnix*) PHASIANIDAE


Ave de 16 - 18 cm, pequeña, marrón ocre, con marcas marrones oscuras en pecho, cabeza y partes superiores. Estrechass bandas crema en partes superiores y flancos. Cuerpo redondeado.

Reproductor estival
En descenso



E F M A M J

J A S O N D


Perdiz roja (*Alectoris rufa*) PHASIANIDAE

Babero blanco bordeado por una gorguera negra ancha y tosca, el borde inferior se desmenuza en listas pectorales negras. Ave terrestre, de vuelo bajo, rápidos aleteos y planeos con las alas rígidas.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Zampullín chico (*Tachybaptus ruficollis*) PODICIPEDIDAE.


El menor de los somormujos tiene cuello corto, cuerpo rollizo, cola corta y pico recto y pequeño. Mejillas y parte anterior del cuello castaño. Habita en ríos, lagos y charcas con vegetación de carrizales y juncos.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J

J A S O N D




Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*) **PHALACROCORACIDAE**. 77 - 94 cm de largo y 121 - 149 de envergadura. Cuello largo y grueso, perfil de la cabeza en forma de cono, pico grueso con un pequeño gancho en la punta.

Invernante
Abundante



E F M A M J
J A S O N D



Garza real (*Ardea cinerea*) **ARDEIDAE**

Ave grande, gris por encima y blanco gris por debajo. Cuello largo blanco gris pálido, con una banda central blanca listada de negro. Pico fuerte, largo y recto. Pluma ornamental larga y negra en la cabeza.

E F M A M J
J A S O N D



Rep. invernante/ocasional
En aumento/abundante


Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia*) **CICONIIDAE**

Alcanza de 100 a 115 cm de altura, con una envergadura de 155 a 195 cm. Los adultos tienen el pico y las patas de color anaranjado a rojo. Anida habitualmente en edificios y árboles.

Reproductor estival
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Abejero europeo (*Pernis apivorus*) **ACCIPITRIDAE**

Parecido al busardo ratonero, pero más esbelto, de alas y cola más larga y cabeza prominente. De hábitos forestales, se alimenta sobre todo de avispas. Nidifica en la zona este de la comarca.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
Estable


Elanio común (*Elanus caeruleus*) **ACCIPITRIDAE**

Del tamaño del cernícalo, pero más rechoncho y de plumaje muy claro. Cabeza casi blanca, espalda y alas gris hombros negros. Ojos de color rojo oscuro y patas amarillas. Se cría y habita en lugares abiertos.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor ocasional
En aumento


Milano negro (*Milvus migrans*) **ACCIPITRIDAE**

Menor que el real, con alas y cola más cortas, ésta menos ahorquillada y de color pardo gris por encima. Plumas oscuras, marrón oscuro. Habitante estival de zonas húmedas y riberas fluviales.

Reproductor estival
Estable



E F M A M J
J A S O N D


Milano real (*Milvus milvus*) **ACCIPITRIDAE**

Alas largas y estrechas, en vuelo algo arqueadas. Cola larga y muy ahorquillada, rojiza por encima, más pálida por debajo. Vuelo lento, torciendo constantemente la cola, con planeos y aleteos suaves.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
En descenso

Alimoche (*Neophron pernocterus*) **ACCIPITRIDAE**

Cabeza pequeña, pico largo y fino. Alas anchas. Cuerpo, cabeza, cola y coberteras blancas. Cara amarillenta, con piel desnuda. Aleteo lento y profundo, buen planeador. Frecuenta vertederos.

Reproductor estival
En descenso



E F M A M J
J A S O N D




Buitre leonado (*Gyps fulvus*) **ACCIPITRIDAE**

250 cm de envergadura alar, mayor que las águilas. Alas anchas, secundarias redondeadas, cola corta redondeada. Plumas alares y de cola oscuras, cuerpo más claro. Muy planeador, aleteos lentos.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Culebrera europea (*Circaetus gallicus*) **ACCIPITRIDAE**

Alas largas y anchas, cola estrecha en la base y larga como la anchura alar. Partes inferiores pálidas, cabeza y pecho gris, barrado. Cola con tres franjas oscuras. Áreas de montaña y quebradas.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
Estable

Aguilucho pálido (*Circus cyaneus*) **ACCIPITRIDAE**

Alas y cola largas, machos adultos con extremos alares negros, partes inferiores blancas, cabeza y pecho gris azulado, borde posterior del ala oscuro. Hembras con partes superiores marrones.

Reprod. sedent./invern.
En aumento



E F M A M J
J A S O N D



Aguilucho cenizo (*Circus pygargus*) **ACCIPITRIDAE**

Cola y alas largas y estrechas. Se puede confundir con el aguilucho pálido. La hembra es diferente de la del pálido en la forma, con una marcada banda oscura en la parte superior de las secundarias.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
En aumento


Azor común (*Accipiter gentilis*) ACCIPITRIDAE

Alas anchas y cola larga. Espalda de color azulado o gris pizarra, barrado de gris. Ceja blanca. Garras amarillas, fuertes. Vuelos a baja y media altura, muy veloz, con aleteo rápido. Hábitat forestal.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Gavilán común (*Accipiter nisus*) ACCIPITRIDAE

Similar al azor, pero más pequeño. Alas cortas y anchas, cola larga barrada. Patas finas, parte inferior con tonos rojizos o blancos. Ojos claros. De marcados hábitos forestales. Vuelo ágil y veloz.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J

J A S O N D


Busardo ratonero (*Buteo buteo*) ACCIPITRIDAE

Rapaz rolliza, con alas anchas, cuello ancho y corto. Cola corta. Pecho barrado de blanco, o casi blanco. Plumaje de pálido a marrón oscuro. Vuelo con aleteos rápidos y planeos, cola en abanico.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Águila real (*Aquila chrysaetos*) ACCIPITRIDAE


Hasta 240 cm de envergadura alar, alas largas más estrechas en la base y cola tan larga como la anchura alar. Color marrón oscuro, los jóvenes con manchas blancas en las alas y en la base de la cola.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J

J A S O N D




Aguila calzada (*Hieraaetus pennatus*) **ACCIPITRIDAE**

De 110 a 135 cm de envergadura. Ala uniformemente ancha. Cola ancha con lados rectos y vértices puntiagudos. Tiene dos fases, pálida y oscura. Vuelo rápido, recto, con largos planeos.

Reproductor estival
En aumento



E F M A M J
J A S O N D



Águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*) **ACCIPITRIDAE**

Envergadura alar de entre 145 y 170 cm. Alas anchas y cola recta, ancha y cuadrangular. Parte inferior del cuerpo y borde alar anterior blanquecino, con alas oscuras. Vuelo rápido y muy potente.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
En descenso


Cernícalo primilla (*Falco naumanni*) **FALCONIDAE**

Similar al cernícalo común, pero más pequeño. Tiene las uñas blancas. Macho, cola y cabeza gris cenicienta; hembra y pollos del mismo tono pardo barrado de negro. Anida en colonias, en edificios.

Reproductor estival
En aumento



E F M A M J
J A S O N D



Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus*) **FALCONIDAE**

Alas y cola largas, alas estrechas en la base y romas en las puntas. Tonos rojizos, azulados en los machos en cola y cabeza. Vuelo con aleteos rápidos, frecuentes cernidos con la cola en abanico.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable


Alcotán (*Falco subbuteo*) FALCONIDAE

Similar al halcón, pero más pequeño y con alas largas y puntiagudas. Oscuro por encima, mancha blanca en garganta y mejillas, bigotera negra. Calzas de color rojizo intenso. Vuelo rápido y ágil.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
Estable


Halcón peregrino (*Falco peregrinus*) FALCONIDAE

Hasta 100 cm de envergadura. Cabeza oscura, anillo ocular y patas amarillas. Gris oscuro por encima, blanco barrado por delante. Alas muy puntiagudas y cola bastante corta. Aleteo rápido, vuelos en picado.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D


Rascón (*Rallus aquaticus*) RALLIDAE

Largo pico rojo, cara, garganta y pecho gris pizarra oscura, flancos barrados. Partes superiores pardo con rayas negras, blanco bajo la cola, hembra -fotomás apagada que el macho.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
En aumento


Focha común (*Fulica atra*) RALLIDAE

Plumaje negro más intenso en cabeza y cuello, excepto el escudete frontal y el pico, que son blancos. Tiene una estrecha franja blanca en el ala cuando vuela, lo que hace muy a ras de agua.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Gallineta común (*Gallinula chloropus*) **RALLIDAE**

Plumaje oscuro, patas largas y verdosas con dedos largos. Pico rojo con la punta amarilla. Línea blanca a lo largo del cuerpo y los lados de las infracoberteras caudales. Vuelo bajo, de aleteo rápido.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Alcaraván (*Burhinus oedicnemus*) **BURHINIDAE**

Cuerpo alargado con bandas pardas oscuras. Ojo amarillo, con bandas claras por encima y por debajo, con pico de punta negra y base amarilla. Patas largas amarillo claro. Vuelo bajo, rápido y fuerte.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
En descenso

Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*) **CHARADRIIDAE**

Anillo ocular amarillo, patas largas de color rosado. Pico fino, robusto y negro. Línea ocular blanca, banda negra en la frente, mancha auricular oscura. Vuelo bajo y rápido con las alas en ángulo.

Reproductor estival
En aumento



E F M A M J
J A S O N D



Avefría (*Vanellus vanellus*)

Plumaje blanco y negro, compacta, cabeza rematada con una fina cresta. Partes superiores oscuras. Tono rojizo bajo la cola. Patas cortas y finas. Aleteo regular con los extremos alares muy redondeados.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor ocas./migrad.
En aumento/abundante


Andarriños chico (*Actitis hypoleucos*) **SCOLOPACIDAE**

Pardo por encima. Franja blanca con forma de luna, delante del ala. Manchas claras en el borde del ala. Pecho blanquecino. Patas verdoso-parduscas. Vuelo a ras de agua, aleteos rápidos.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor estiv/migrad.
Sin datos/abundante

Paloma torcaz (*Columba palumbus*) **COLUMBIDAE**

Unos 70-80 cm de envergadura. Paloma grande con cola larga, cabeza pequeña, con una mancha blanca en el pecho, banda blanca en la parte superior del ala. Vuelo rápido y potente.

Rep. sedent/migrad./inver.
En aumento



E F M A M J

J A S O N D


Tórtola turca (*Streptopelia decaocto*) **COLUMBIDAE**

Tamaño mediano y cola larga. Fino collar negro con bordes blancos. Tono algo más marrón en la espalda y gris azulado en coberteras. Ojo oscuro. Vuelo ascendente con posterior planeo.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
En aumento

Tórtola común (*Streptopelia turtur*) **COLUMBIDAE**

Pequeña y esbelta, dorso pardo vivo con márgenes de las plumas marrón anaranjado brillante y centros negros. Alas largas y puntiagudas. Ojo naranja rodeado de zona desnuda rojiza. Pecho rosado.

Reproductor estival
En descenso



E F M A M J

J A S O N D



Cuco (*Cuculus canorus*) **CUCULIDAE**

Mediano, cola larga y redondeada, alas puntiagudas. Partes superiores, cabeza y pecho gris azulado. Parte inferior blanca con barras grises. Iris, anillo orbital, base del pico y pies amarillos.

Reproductor estival
Estable



E F M A M J
J A S O N D




Lechuza común (*Tyto alba*) **TYTONIDAE**

Cabeza desproporcionadamente grande, disco facial en forma de corazón. Ojos oscuros. Partes inferiores, pecho y vientre blancos. Patas fuertes y dedos parcialmente emplumados.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable




Autillo (*Otus scops*) **STRIGIDAE**

Color general pardo grisáceo o pardo rojizo, manchado, barrado y rayado de pardo negruzco. Pequeñas "orejas", con frecuencia ocultas, ojos amarillos o amarillo-verdoso.

Reproductor estival
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Mochuelo (*Athene noctua*) **STRIGIDAE**


Cabeza grande y redondeada, patas largas y cola corta. Marrón por encima moteado de blanco. Cejas blancuzcas y oblicuas. Ojo amarillopálido, grande. De hábitos más diurnos que sus congéneres.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable




Búho real (*Bubo bubo*) STRIGIDAE

Hasta 170 cm de envergadura. Cabeza grande, orejas largas, visibles. Ojos grandes anaranjados. Partes inferiores pardo con listas oscuras, anchas. Partes superiores color marrón de tono más oscuro.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
En aumento

Cárabo (*Strix aluco*) STRIGIDAE


Mediano, compacto, alas anchas y redondeadas, cabeza grande y redonda. Ojos negros. Color de fondo pardo gris con el plumaje moteado, finamente listado. Discos faciales lisos. Forestal.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J

J A S O N D


Búho chico (*Asio otus*) ANATIDAE

De 85 a 100 cm de envergadura. Alas largas y bastante estrechas, Largas orejas a menudo visibles en cortejo y en alerta. Parte inferior del cuerpo listada regularmente, cola densamente barrada.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Lechuza campestre (*Asio flammeus*) STRIGIDAE

Mediana, alas y patas largas. Cabeza grande. Cara pálida con forma de corazón. Orejas poco notables. Ojos oscuros. Partes inferiores blancas. Partes superiores grises y ocre. Suele anidar en el suelo.

Reprod. ocasional/invernan.
En aumento/estable



E F M A M J

J A S O N D



Vencejo común (*Apus apus*) **APODIDAE**

Plumaje negro. Garganta y frente más pálidas. Alas en forma de guadaña. Pico pequeño y boca grande y ancha. Patas pequeñas, con cuatro dedos fuertes hacia delante. Pasa casi toda su vida en vuelo.

Reproductor estival
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Martín pescador (*Alcedo atthis*) **ALCEDINIDAE**

Colores muy vivos, píleo y alas azul verdoso, dorso y cola azul brillante. Partes inferiores y mejilla rojo anaranjado. Garganta y mancha blanca en el lado del cuello. Pico y cabeza grandes, patas cortas.

E F M A M J
J A S O N D



Reprod.sedent./invernante.
En descenso/escaso


Abejaruco (*Merops apiaster*) **MEROPIDAE**

Mediano, plumas de colores brillantes y llamativos. Pecho azul, vientre verdoso, cabeza canela, cuello amarillo y lista en el ojo, éste de color rojo intenso. Pico largo, fino y algo curvado. Cola larga, con pequeña proyección de 0 a 3 cm.

Reproductor estival
En aumento



E F M A M J
J A S O N D



Abubilla (*Upupa epops*) **UPUPIDAE**

Plumaje anaranjado-rosado, con alas y cola listadas de blanco y negro. Penacho de plumas eréctiles que despliega como un abanico. Pico fino, largo y ligeramente curvado hacia abajo. Vuelo ondulante.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
Estable


Pito real (*Picus viridis*) PICIDAE

El más cromático de los pájaros carpinteros. Píleo carmesí, partes superiores verde mate, inferiores verde grisáceo claro, obispillo amarillento, lista bajo el ojo roja en el macho y negra en la hembra. Vuelo ondulante.

E	F	M	A	M	J
J	A	S	O	N	D



Reproductor sedentario
Estable

Pico picapinos (*Dendrocopos major*) PICIDAE

Negro con parches y manchas blancas, el macho con plumas carmesí en la cabeza, los jóvenes, con píleo rojo, ambos sexos rojo debajo de la cola. Vuelo rectilíneo con grandes ondulaciones.

Reproductor sedentario
Estable



E	F	M	A	M	J
J	A	S	O	N	D


Calandria (*Melanocorypha calandra*) ALAUDIDAE

Ventre blanco con una franja negra en el cuello, plumaje de tonos parduzcos en ambos sexos. Uña del dedo posterior alargada. Pico robusto de tonos pardo-amarillentos. La mayor de las alaúidas.

E	F	M	A	M	J
J	A	S	O	N	D



Reproductor sedentario
En descenso

Cogujada común (*Galerida cristata*) ALAUDIDAE

Dorso y pecho pardo rayado, con cresta en abanico, larga y puntiaguda, visible incluso plegada. Ventre color crema con bandas difusas en el pecho. Línea oscura bajo el ojo, pico largo.

Reproductor sedentario
Estable



E	F	M	A	M	J
J	A	S	O	N	D



Alondra común (*Alauda arvensis*) **ALAUDIDAE**

Pardo grisácea, listada por encima y en el pecho, las listas del pecho terminan abruptamente por encima del vientre blanco y sin marcas. El macho puede erguir su cresta roma en el píleo.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Avión zapador (*Riparia riparia*) **HIRUNDINIDAE**

Pequeño, parte superior parda con blanco por debajo, franja pectoral pardo-gris bien marcada. Garganta blanca, alas pardas, infracoberteras alares más oscuras. Cola ligeramente ahorquillada.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
Estable

Golondrina común (*Hirundo rustica*) **HIRUNDINIDAE**

Alas puntiagudas largas, cola muy ahorquillada con rectrices exteriores alargadas. Partes superiores negras, inferiores blancas. Franja en el pecho negro azulada, garganta y frente rojizas.

Reproductor estival
En descenso



E F M A M J
J A S O N D



Avión común (*Delichon urbicum*) **HIRUNDINIDAE**

Pequeño, obispillo y partes inferiores desde la garganta blancos, partes superiores negras, brillo azulado en el píleo. Cola negra, corta y ligeramente ahorquillada. Pies cubiertos de plumas blancas.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
Estable



Bisbita alpino (*Anthus spinoletta*) **MOTACILLIDAE**

Tonalidades grisáceas en sus partes superiores y pálidas en las inferiores con pecho rosáceo y sin rayar en época nupcial y rayado el resto del año. Patas oscuras y ceja blanca.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable


Lavandera boyera (*Motacilla flava*) **MOTACILLIDAE**

Amarillo intenso por debajo. Manto y dorso verde grisáceo. Patas negras, largas y delgadas. Alas gris pardusco, con bandas alares marcadas y estrechas amarillo pálido. Banda sobre el ojo. Coronilla verde.

Reproductor estival
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Lavandera blanca (*Motacilla alba*) **MOTACILLIDAE**

Cola larga, estrecha y negra que mueve continuamente arriba y abajo. Píleo y nuca negros. Frente y parte anterior del píleo blancos. Babero negro azabache del pico al pecho. Bandas alares.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Chochín (*Troglodytes troglodytes*) **TROGLODYTIDAE**

Muy pequeño, con una cola pequeña que levanta verticalmente y que mueve constantemente. Cuello corto. Pardo rojizo por encima y blanco pardusco por debajo con finas manchas oscuras. Vuelo bajo, rápido y corto,

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D




Petirrojo (*Erithacus rubecula*) **TURDIDAE**

Pardo, con el pecho y la cara rojo herrumbroso, a modo de babero. Pico fino y oscuro. Estrecha banda alar amarillenta. Patas finas y largas. Ojo grande negro. Cola corta que suele levantar.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Colirrojo tizón (*Phoenicurus ochruros*) **TURDIDAE**

Negro grisáceo con una mancha alar blanca, en hembras e inmaduros, el color es más grisáceo pálido. Partes superiores grises. Cola rojiza, que hace vibrar constantemente. Vuelo ágil. Es muy atrevido.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable



Tarabilla común (*Saxicola torquatus*) **TURDIDAE**

Cabeza y garganta negras. Mancha blanca en lado del cuello. Pecho naranja rojo herrumbre hasta los flancos, vientre más pálido. Obisplillo marrón moteado de oscuro, con una mancha blanca.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Collalba gris (*Oenanthe oenanthe*) **TURDIDAE**

Cola blanca y negra con forma de T. Parte superior gris. Ceja ocre pálido o blanca, máscara ocular negra, alas negras y garganta y pecho ocre amarillento que pasa a blanco a finales de verano.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
Estable



Roquero rojo (*Monticola saxatilis*) TURDIDAE

Cabeza, cuello, garganta y parte superior de la espalda gris azulado. Cola castaño anaranjado. Alas marrón oscuro con puntas más claras. Partes inferiores anaranjadas, pico pardo oscuro.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor estival
Estable

Mirlo común (*Turdus merula*) TURDIDAE

En el macho, plumaje oscuro, pico y anillo ocular amarillo. Cola larga, que mueve arriba y abajo. Hembra de cuerpo pardo oscuro, con garganta de un pardo más claro, moteado difuso en el pecho.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J

J A S O N D



Zorzal común (*Turdus philomelos*) TURDIDAE

Marrón por encima y blanco por debajo, moteado de negro, con las pintas en punta de flecha. Parte inferior del ala ocre herrumbroso. En los flancos, borde del ala y pecho color ocre. Patas rosadas.

E F M A M J

J A S O N D



Reprod. sedent./invernan.
Estable/abundante

Carricero com. (*Acrocephalus schoenobaenus*) SYLVIIDAE

Cabeza puntiaguda con pico largo, fino y pálido. Pardo claro por encima y blanco ocráceo por debajo, con la garganta blanca. Tonos más cálidos en flancos. Anillo ocular fino y pálido. Píleo y manto marrón.

Reproductor estival
Estable



E F M A M J

J A S O N D



Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*) **SYLVIIDAE**

Gris por encima y gris más claro por debajo. Macho con capirote negro. La cola carece de blanco en todas las plumas. Pico y patas grises. Hembra con capirote castaño, algo más parda que el macho.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*) **SYLVIIDAE**

Pardo-verdoso, teñido de gris por encima. Por debajo blanquecino y ocre en garganta y pecho. Pardo-ocráceo en el costado del pecho. Patas oscuras, pico fino y oscuro, ceja pálida. Lista ocular oscura.

E F M A M J
J A S O N D



Reprod. sedent./invernan.
Sin datos/abundante


Papamoscas gris (*Muscicapa striata*) **MUSCICAPIDAE**

Pardo grisáceo y esbelto, cabeza grande con píleo redondeado pardo suave, ligeramente listada en la coronilla, pico oscuro, largo y fuerte. Alas y cola largas, patas y cola negras. Ojo oscuro.

Reproductor estival
Sin datos



E F M A M J
J A S O N D




Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) **MUSCICAPIDAE**

Parte inferior blanca, dorso negro, cola negra con banda estrecha blanca en los lados. Mancha blanca en la frente. Hembra con las partes superiores pardas, sin mancha blanca en la frente.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
Estable


Carbonero garrapinos (*Parus ater*) PARIDAE

Cabeza negra con grandes manchas blancas en las mejillas y una estrecha banda alar. En la nuca mancha ovalada blanca. Partes inferiores ocre grisáceo más oscuro. Dorso gris azulado. Banda alar blanca.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Herrerillo común (*Parus caeruleus*) PARIDAE

Cabeza pequeña y redondeada. Lista ocular negra y capirote azul. Cabeza blanca. Partes inferiores amarillas con estrecha lista central negro grisáceo en el vientre. Alas de tono azul brillante.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J

J A S O N D


Carbonero común (*Parus major*) PARIDAE

Parte inferior amarilla con franja central negra, cabeza de tono negro azulado con grandes manchas blancas en las mejillas, dorso verde musgo y estrecha banda alar blanca en el ala gris azulada.

E F M A M J

J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Trepador azul (*Sitta europaea*) SITTIDAE

Cabeza grande y pico largo y puntiagudo. Gris azulado por encima y más pálido por debajo, con los flancos herrumbre, lista ocular oscura. Cola con base oscura y esquinas blancas. Garras fuertes.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J

J A S O N D




Agateador común (*Certhia brachydactyla*) **CERTHIIDAE**

Blanco y moteado de pardo. Pico puntiagudo y ligeramente curvado hacia abajo. Plumas de la cola rígidas. Parte inferior de los flancos pardusca. Escalones uniformes a lo largo de la banda alar

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Alcaudón dorsirrojo (*Lanius collurio*) **LANIIDAE**

Pecho y vientre rosa claro, garganta blanca, píleo gris ceniza claro, manto pardo rojizo. Antifaz negro, con un estrecho borde blanco por encima. Cola negra con lados blancos. Pico negro y ganchudo.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
En aumento


Alcaudón real (*Lanius meridionalis*) **LANIIDAE**

Gris claro y blanco, de cabeza grande, marcado antifaz negro, alas negras bastante cortas y romas con mancha blanca en la base de las primarias, cola larga y redondeada, negra con lados blancos.

Reproductor sedentario
En descenso



E F M A M J
J A S O N D



Alcaudón común (*Lanius senator*) **LANIIDAE**

Nuca y píleo pardo rojizo. Frente, manto y antifaz negro. Alas negras por encima, con mancha blanca. Dorso con una V blanca. Partes inferiores blancas. Pico grueso con punta en forma de gancho.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor estival
En descenso



Arrendajo (*Garrulus glandarius*) **CORVIDAE**

Plumaje llamativo. Pardo gris rosáceo con cloaca y garganta blancuzcos. Panel azul claro, finamente vermiculado de negro en pliegue alar. Bigotera negra al lado de la garganta y píleo blancuzco.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Urraca (*Pica pica*) **CORVIDAE**

Blanca y negra, con la cola muy larga, de 20 a 30 cm, con lustre verde y redondeadas, con grandes paneles blancos en los hombros. Pico negro y robusto. Coloniza campos, bosques y ciudades.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Corneja (*Corvus corone*) **CORVIDAE**

De 80 a 100 cm de envergadura. Plumaje negro, con tenue brillo lila azulado y verde metálico cuando es nuevo. Alas cortas y anchas. Pico grueso, romo y curvo en el extremo. Borde de la cola redondeado.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable


Cuervo (*Corvus corax*) **CORVIDAE**

Hasta 130 cm de envergadura, es el córvido más grande. Plumas negra con brillo metálico. Pico muy grueso, curvo. Plumas de la garganta densas y dispersas. Alas largas y estrechas.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D




Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) **STURNIDAE**

Pintas blanco amarillentas en las plumas, en invierno más marcadas. Cola corta, pico largo y puntiagudo amarillo vivo. Patas largas, fuertes, pardo rojizas. Forma grandes dormideros.

Invern./Reprod. sedentar.
Abundante/sin datos



E F M A M J
J A S O N D



Estornino negro (*Sturnus unicolor*) **STURNIDAE**

Completamente negro, sin pintas. Cola corta y pico largo, puntiagudo y amarillo de base azul. Patas rosa claro. En invierno, hembras e inmaduros con pintas pálidas en dorso e infracoberteras caudales.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Gorrión común (*Passer domesticus*) **PASSERIDAE**

Dorso pardo listado de negro. Babero y región ocular negros. Píleo gris, lados castaños. Lados de la garganta blancuzcos, mejilla gris oscura. Banda alar blanca. Hembra gris pardo por debajo y pardo sucio por encima.

Reproductor sedentario
En descenso



E F M A M J
J A S O N D



Gorrión molinero (*Passer montanus*) **PASSERIDAE**

Dorso marrón listado de negro, banda alar blanca, babero y pico negros. Partes inferiores grises pardo. Píleo pardo rojizo, lado de la cabeza blanco puro, con gran mancha negra en la mejilla. Babero negro.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable



Gorrión chillón (*Petronia petronia*) **PASSERIDAE**
Cabeza ancha y pico fuerte. Listado, con mucho dibujo alar y ancha ceja pálida entre los lados oscuros del píleo y la lista ocular oscura. Partes inferiores blancuzcas listadas de gris.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs*) **FRINGILLIDAE**
Doble banda alar blanca, lados de la cola blancos y obispillo verde grisáceo, lados de la cabeza y pecho rojizos, píleo y nuca grises azulados, manto pardo rojizo. Alas oscuras con bordes amarillentos.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Verderrón común (*Carduelis chloris*) **FRINGILLIDAE**
Pico rosa pálido o marfil. Tono verdoso amarillento en partes inferiores, amarillo en la base de la cola. Partes superiores verde gris, lados de la cabeza grisáceos, mancha oscura entre pico y ojo.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Jilguero (*Carduelis carduelis*) **FRINGILLIDAE**
Cara roja, resto de la cabeza blanca y negra, alas negras con mancha alar amarilla y destacado obispillo blanco. Cola negra con pintas blancas. Pico largo y puntiagudo, blanco marfil.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D




Pardillo común (*Carduelis cannabina*) **FRINGILLIDAE**

Lado de la cabeza pálido por encima y detrás del ojo, mejillas oscuras con pinta pálida en el centro. Rojo-rosado en frente y pecho. Nuca gris uniforme. Manto y dorso marrones, garganta blanco ocráceo.

Reproductor sedentario
Estable



E F M A M J
J A S O N D



Camachuelo común (*Pyrrhula pyrrhula*) **FRINGILLIDAE**

Píleo y cara negros. Macho rojo ladrillo y hembra ocre grisácea. Macho con manto y dorso gris ceniza, la hembra tiene el gris teñido de pardusco. Alas y cola largas. Mancha blanca y cola negra.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*) **FRINGILLIDAE**

Pico triangular potente, negro grisáceo, de base gris azulada, cabeza grande y cuello grueso, cola corta. Colores dominantes ocre y pardo herrumbroso, con ornamentos blancos, negros y grises.

Reproductor sedentario
Sin datos



E F M A M J
J A S O N D



Escribano soteño (*Emberiza cirius*) **EMBERIZIDAE**

Píleo pardo gris, verdoso y listado. Garganta y lista ocular negras, franja pectoral verde oliva. Obispillo pardo gris, listado. Lados de la cabeza con marcas oscuras y fondo pálido, hombros pardo rojizos.

E F M A M J
J A S O N D



Reproductor sedentario
Estable


Escribano palustre (*Emberiza schoeniclus*) EMBERIZIDAE

Quedan unas 400 parejas en España: el ave del año 2009 está en peligro crítico. En la época de celo, el macho presenta la cabeza negra y una franja blanca en el cuello. Esta coloración se oculta tras la muda.

E F M A M J

J A S O N D


Migrador e invernante
Escaso

Triguero (*Emberiza calandra*) EMBERIZIDAE

Pardo gris, listado de oscuro por encima y blanco ocráceo por debajo, con listas oscuras en los lados de la garganta, pecho y flancos. Patas y lados del pico rosa amarillento.

Reproductor sedentario
Estable


E F M A M J

J A S O N D



Aves ocasionales



Porrón moñudo (*Aythya fuligula*) ANATIDAE

Plumaje del macho de color negro, salvo los flancos blancos y las rectrices de la cola de color gris. Moño colgante de la cabeza. Ojo amarillo. Pico azulado. Plumaje de la hembra, pardo oscuro.


Migrador e invernante
Escaso

Cerceta común (*Anas crecca*) ANATIDAE

El macho tiene partes superiores grises y cabeza castaño rojizo con franja verde metálico alrededor del ojo, llegando ésta hasta la nuca y lista blanca por encima de las alas

Invernante
Abundante


Archibebe Común (*Tringa totanus*) **SCOLOPACIDAE**

Plumaje pardo oscuro rayado de negro por encima, pecho y flancos. Vientre blanco. Franjas alares blancas muy visibles en vuelo. Patas rojo-anaranjadas. Pico muy recto, de color rojo.

Migrador
Abundante



Buitre negro (*Agypius monachus*) **ACCIPITRIDAE**

La mayor ave de la Península. Plumas del dorso marrones con tintes negruzcos, zona ventral más oscura. Cuello y cabeza desnudos, cara y parte superior de la cabeza cubiertas por plumón.



Accidental
Escaso

Agachadiza común (*Gallinago gallinago*) **SCOLOPACIDAE**

Limícola mediana, de pico largo, ligeramente curvo hacia abajo. Rolliza, con patas cortas. Dorso pardo oscuro con listas crema, vientre blanco, pecho listado y flancos barrados.

Invernante
Abundante



Lúgano (*Carduelis spinus*) **FRINGILLIDAE**

Plumaje verde-amarillo, con listas oscuras en dorso y flancos. El macho con babero y frente negros, la hembra más apagada, menos amarilla y más rayada. Vuelo ondulante típico de fringílido.



Migrador/invernante
Sin datos/abundante

DIRECCIÓN

Tomás Crespo Trevijano

FOTOGRAFÍAS

Nicolás Gallego Rojas - Julen e Íñigo Zuberogitia Arroyo

Miguel Ángel Petit Campo - Tomás Crespo Trevijano

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Mediados Castilla y León

DL: MU-1823-2010



BIBLIOGRAFÍA

- Román, J. F. Román, L. M. Ansoa, C. Palma y R. Ventosa (1996). Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos. Ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico. Burgos.
 - González, D. Román, F. y Lobo J.L. (2009). Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen II. Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos.
-

Edita

© Adeco Bureba
C/ Santa Inés, 9 - Bajo
09240 Briviesca (Burgos)

Tel: 947 59 38 31
Fax: 947 59 38 64
nfo@adecobureba.com
www.adecobureba.com



Financiado por:



Junta de
Castilla y León



FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
RURAL Y MEDIO RURAL
INICIATIVA DE DESARROLLO
RURAL



MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO



Diputación
Provincial
de Burgos

Ejemplar de distribución gratuita